



# Avertissements<sup>®</sup>

## agricoles

## Auvergne

ISSN : 0763 - 7756

### Grandes cultures

Le 3 Mai 1989

N° 9

**COLZA** : Sclérotinia Intervenir en situations tardives  
**BLE** : Maladies - Agir au gonflement.  
**BETTERAVES** : Attention aux pucerons.  
**AIL** : Teigne - Intervenir.

### COLZA

Stades ( Floraison - F2  
 ( à  
 ( Dix premières siliques de 2 à 4 cm - G 3.

#### MALADIES

##### ✱ Situation

- ✧ Cylindrosporiose : toujours absente
- ✧ Pseudocercospora : peu d'évolution.
- ✧ Sclérotinia : les conditions climatiques actuelles sont très favorables.

##### ✱ Préconisations

- Pour les parcelles aux stades F2 - G1 : Intervenir d'urgence.
- Pour les autres : il est trop tard en général.

Il est à noter que RONILAN et SUMISCLEX ont un pouvoir curatif (le 1er de 3 à 5 jours, le 2ème de 5 à 7 jours).

#### CHARANCONS DES SILIQUES

##### ✱ Situation

Activité faible actuellement.

##### ✱ Préconisation

Dès le stade G2 - G3 un traitement de bordure peut se justifier que très rarement. Il faut intervenir dès l'observation d'un charançon pour 2 plantes afin de limiter les pontes et les attaques de cécidomyies.

### SOJA

#### DESHERBAGE

➤ RONSTAR s'applique à 2 l/ha en sols légers (Val d'Allier) malgré une légère phytotoxicité pour contrôler les **renouées** (oiseau et liseron) et les **amaranthes** dans le cadre d'un programme avec LASSO ou DUELOR.

➤ BASAGRAN en post-levée en fractionné (2 fois 1,5 l + huile) permet de contrôler l'**ambrosie à feuille d'armoise** sur adventices jeunes.

## BLE

Stades ( 2 noeuds - 7  
( Début gonflement - 8

### MALADIES

#### ★ Situation

✧ Rouille brune : pustules isolées localement sur THESEE, TALENT, FESTIVAL (et Triticale : CLAIRCAL)  
✧ Oïdium : en évolution  
✧ Septoriose : sur feuilles âgées. Pression faible actuellement. Les fortes pluies sont très favorables.

#### ★ Préconisations

*Dans la majorité des situations, attendre le stade gonflement pour intervenir avec un produit performant en cas de progression de la septoriose et de la rouille brune.  
Surveiller la rouille jaune (absente dans la région) mais signalée dans la moitié Nord de la France).*

## BETTERAVES

La levée est en cours

### PUCERONS ET JAUNISSE

#### ★ Situation

Attention - Les premiers pucerons sont déjà capturés en bac jaune à PONT-DU-CHATEAU (63)

#### ★ Préconisation

*Intervenir dès la levée complète (stade 1 à 2 feuilles) sur les parcelles traitées au semis avec FORCE 4 ou FORCE 12 (sans effet sur les pucerons). Les microgranulés autres que DACAMOX et TEMIK ont une rémanence de 3 semaines environ, il faut donc être aussi très vigilant dès maintenant.*

Utiliser une association à base de pyréthrianoïde pour ce premier traitement : DECIB B - MAVRIK B - SUMIMETON - KARATE K.

On choisira une autre spécialité pour les protections suivantes comme : PIRIMOR G - METASYSTEMOX - ANTHONOX ou DIPTEREX MR.

## AIL

### TEIGNE DU POIREAU

#### ★ Situation

Début des captures dans le secteur de CHAMPEYROUX et de PONT-DU-CHATEAU.

#### ★ Préconisation

*Intervenir avec les matières actives suivantes dès que les températures dépassent 15 °C (ponte des femelles).*

- Organo-phosphorés :

Azinphos-éthyl (40 g/hl)

Parathion-éthyl et méthyl (40 g/hl)

Méthidathion (30 g/hl)

SEPIZIN L

Nombreuses spécialités

ULTRACIDE 20

- Pyréthrinoides :

Deltaméthrine (0,75 g/hl)

Cyfluthrine (1,5 g/hl)

Lambda cyhalothrine (0,75 g/hl)

Alphaméthrine (1 g/hl)

Cyperméthrine (3 g/hl)

DECIS

BAYTHROID

KARATE

FASTAC

Nombreuses spécialités